

Nem lineáris dinamikai modellek a biológiában

1. tétel – Egy-faj mátrix-modellek

- Fibonacci
- Leslie
- korfa
- utódok átlagos száma
- $R \leq 1 \Leftrightarrow r \leq 1$ tulajdonság
- boldogság
- pozitív mátrixok Perron-Frobenius tulajdonságai

Nemnegatív mátrixok hatványozására vezető feladatok:

PERRON-FROBENIUS TÉTEL: Legyen $\mathbf{A} = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^n$ nemnegatív, primitív mátrix. (Azaz ha az $\mathbf{A}$ mátrixnak alkalmas k_0 -adik hatványa csupa pozitív elemet tartalmaz – vagy ami ezzel ekvivalens, ha az irányított átmenetgráf összefüggő és köréi hosszának LNKO-ja egy. Konvenció: $(\{i\} \rightarrow \{j\}) \in E(\mathcal{G}) \Leftrightarrow a_{ji} > 0$.) Ekkor $\lambda_1 = r > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|$. Az $r > 0$ domináns sajátértékhez tartozó domináns sajátvektor jobbról $\mathbf{v} > \mathbf{0}$, balról $\mathbf{w}^T > \mathbf{0}^T$, a $\mathbf{w}^T \mathbf{v} = 1$ normálással. Továbbá

$$\frac{1}{r^k} \mathbf{A}^k \rightarrow \mathbf{v} \mathbf{w}^T \text{ ha } k \rightarrow \infty \text{ és a konvergencia rendje lényegében } \frac{1}{r^k} |\lambda_2|^k.$$

Tanulságos gyakorló feladat: Legyen $\mathbf{A} = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^n$ 0-1 mátrix. A.) Igazolja, hogy $(A^k)_{i,j}$ az átmenetgráf j -edik csúcsából az i -edik csúcsba vezető k hosszúságú irányított utak száma. B.) Határozza meg a k_0 értékét 1.) az $\mathbf{A}$ mátrix első néhány hatványa révén illetve 2.) az $\mathbf{A}$ mátrixhoz rendelt átmenetgráf közvetlen vizsgálatával – ha $n = 4$ és $a_{11} = a_{14} = a_{21} = a_{32} = a_{43} = 1$ és a többi a_{ij} nulla.

λ_1 – legnagyobb sajátérték

$$(i \rightarrow j) \in E(\mathcal{G}) \Leftrightarrow a_{ij} > 0$$

$r > 0$ – domináns sajátérték

FIBONACCI

PÉLDA 1. – FIBONACCI REKURZIÓ: Az $f_0 = f_1 = 1$, $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$) másodrendű lineáris rekurziót felbontva az n -edik év ifjú és öreg nyúl párjainak száma szerinti két elsőrendű, egymáshoz csatolt $i_{n+1} = o_n$, $o_{n+1} = i_n + o_n$ lineáris rekurzióra, amelyek együtt mátrixos alakban is felírhatók:

$$\begin{pmatrix} i_{n+1} \\ o_{n+1} \end{pmatrix} = \mathbf{F} \begin{pmatrix} i_n \\ o_n \end{pmatrix}, \text{ ahol } \mathbf{F} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ és } \begin{pmatrix} i_0 \\ o_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} i_k \\ o_k \end{pmatrix} = \mathbf{F}^k \begin{pmatrix} i_0 \\ o_0 \end{pmatrix}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Rightarrow f_k = i_k + o_k = \frac{1}{\sqrt{5}} (\lambda_1^{k+1} - \lambda_2^{k+1}), \text{ ahol } \lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \text{ az } \mathbf{F} \text{ mátrix sajátértékei.}$$

PÉLDA 2. – STABIL KORFA AZ $\mathbf{L}$ LESLIE-MÁTRIXBÓL négy korosztály esetén, a $b_1, b_2, b_3 > 0$ születési/birth és az $s_1, s_2, s_3 > 0$ túlélési/survival rátákkal (amikor szintén teljesülnek a Perron-Frobenius tétel feltételei)

Tjh: megoldás $\lambda^n \cdot \underline{v}$ alakú

$$\lambda^{n+1} \cdot \underline{v} = \mathbf{F} \cdot \lambda^n \cdot \underline{v} \longrightarrow \lambda \cdot \underline{v} = \mathbf{F} \cdot \underline{v}$$

$$\det(\mathbf{F} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} \longrightarrow \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

$$\hookrightarrow \mathbf{F} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$r = \lambda_1 > \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{alap mo: } \lambda_1^n \cdot \underline{x}_1, \lambda_2^n \cdot \underline{x}_2$$

↓
ált. mo:

$$c_1 \lambda_1^n \cdot \underline{x}_1 + c_2 \lambda_2^n \cdot \underline{x}_2$$

kezdeti felt:

$$\underline{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

PÉLDA 2. - STABIL KÖRFA AZ L LESLIE-MÁTRIXBÓL négy korosztály esetén, a $b_1, b_2, b_3 > 0$ születési/birth és az $s_1, s_2, s_3 > 0$ túlélési/survival rátákkal (amikor szintén teljesülnek a Perron-Frobenius tétel feltételei)

$$L = \begin{pmatrix} 0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ s_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{1}{r^k} \begin{pmatrix} x_1^k \\ x_2^k \\ x_3^k \\ x_4^k \end{pmatrix} = \frac{1}{r^k} L^k x^0 \rightarrow (vw^T)x^0 = (w^T x^0)v \text{ ha } k \rightarrow \infty.$$

Korlatályos lineáris modell egy populáció időbeli méretére

L^k - k. korlatályban mi len

r - legnagyobb sajátérték = λ_1


R - átlagos utódok száma/egyed

$R > 1 \Leftrightarrow r > 1 \rightarrow$ népesség robbanás

$R = 1 \Leftrightarrow r = 1 \rightarrow$ stabil népesség

$R < 1 \Leftrightarrow r < 1 \rightarrow$ csökkenő népesség

$$R = r_1 b_1 + s_1 s_2 b_2 + s_1 s_2 s_3 b_3$$



piramis

A karakterisztikus polinom $p_4(\lambda) = \lambda^4 - b_1 s_1 \lambda^2 - b_2 s_1 s_2 \lambda - b_3 s_1 s_2 s_3$. Mivel $1 < r$ és $1 < R$ (ahol is $R = b_1 s_1 + b_2 s_1 s_2 + b_3 s_1 s_2 s_3$ az egyedenkénti utódok átlagos száma) jelentése egyaránt a végtelenhez tartó túlnépesedés, pusztán a biológiai tartalom alapján $1 < r \Leftrightarrow 1 < R$. Hasonlóképpen, mivel mind az $r < 1$, mind az $R < 1$ egyenlőtlenség az aszimptotikus kihalás biológiai tényét fogalmazza meg: $r < 1 \Leftrightarrow R < 1$. Ugye a matematikai bizonyítás — amelyet szintén csak a 4×4 Leslie mátrixokra mutatunk be⁴ — is mennyire szép? (És legalább utólag: mennyire egyszerű?)

PÉLDA 3. - AMIKOR KEVESEBB IGAZ: súlyozott permutáció-mátrix, avagy a cserebogarak/pajorok négy korosztálya. Itt $b_1 = b_2 = 0$ valamint $b_3 s_1 s_2 s_3 = 1$, és a $p_4(\lambda) = \lambda^4 - 1$ polinom gyökei $\pm 1, \pm i$.

$$\frac{L^k \cdot x_0}{r^k} \rightarrow (v \cdot w^T) x_0 = (w^T x_0) v \quad k \rightarrow \infty$$

$r \neq R \rightarrow$ kihalás

$$L_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} 0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ s_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P_4(\lambda) = \lambda^4 - b_1 s_1 \lambda^2 - b_2 s_1 s_2 \lambda - b_3 s_1 s_2 s_3$$


$$P(1) = 1 - R$$

Bizonyítás

éfk. ha $R > 1$

$$P_4(r) = 0$$

r a P_4 domináns gyöke



éfk. $R < 1 \quad \forall \lambda \geq 1$

$$1 > b_1 s_1 + b_2 s_1 s_2 + b_3 s_1 s_2 s_3 \quad / \cdot \lambda^4$$

$$\lambda^4 > b_1 s_1 \lambda^4 + b_2 s_1 s_2 \lambda^4 + b_3 s_1 s_2 s_3 \lambda^4$$

$$\lambda^4 > s_1 b_1 \lambda^3 + s_1 s_2 b_2 \cdot \lambda + s_1 s_2 s_3 \cdot b_3 \quad (\lambda \geq 1 \text{ erősebb, mint a bal oldalt})$$

$$P_4(\lambda) > 0 \text{ ha } \lambda \geq 1 \\ R < 1 \Rightarrow r < 1$$

⁴ Az $r > 1 \Leftrightarrow R > 1$ (és az $r < 1 \Leftrightarrow R < 1$, valamint az $r = 1 \Leftrightarrow R = 1$) összefüggések bizonyítása: A $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{L}$ mátrix determinánsának az első sor szerinti kifejtésével kapjuk, hogy az $\mathbf{L}$ mátrix p_4 karakterisztikus polinomja

$$p_4(\lambda) = \lambda^4 - b_1 s_1 \lambda^3 - b_2 s_1 s_2 \lambda - b_3 s_1 s_2 s_3$$

alakú, amelyből a $\lambda = 1$ választással $p_4(1) = 1 - R$ adódik.

Ha most $R > 1$, akkor $p_4(1) < 0$. De $p_4(\lambda) \rightarrow \infty$ ha $\lambda \rightarrow \infty$ miatt $p_4(\Omega) > 0$ ha $\Omega \in \mathbb{R}$ elegendően nagy. Így a Bolzano tétel alkalmazható az $[1, \Omega]$ intervallumon (vagy ha úgy tetszik, az $[1, \infty)$ félegyenesen). Tehát van olyan $r > 1$ valós szám, hogy $p_4(r) = 0$. Megfordítva, ha $r > 1$, akkor a $p_4(r) = 0$ képletet átrendezve, majd a jobb oldalt okosan növelve, a végén átoszthatunk r^4 -el:

$$r^4 = b_1 s_1 r^2 + b_2 s_1 s_2 r + b_3 s_1 s_2 s_3 < b_1 s_1 r^4 + b_2 s_1 s_2 r^4 + b_3 s_1 s_2 s_3 r^4 \Rightarrow 1 < b_1 s_1 + b_2 s_1 s_2 + b_3 s_1 s_2 s_3 = R.$$

Tehát $R > 1 \Leftrightarrow r > 1$. A még hiányzó $R < 1 \Leftrightarrow r < 1$ eset kezelése sem nehezebb. (Ha ez sikerül, $r = 1 \Leftrightarrow R = 1$ igazolása már csak formális logika dolga.) Amennyiben tehát $R < 1$, akkor az $1 > b_1 s_1 + b_2 s_1 s_2 + b_3 s_1 s_2 s_3$ egyenlőtlenséget a $\lambda \geq 1$ paraméter negyedik hatványával beszorozva

$$P_4(1) = 1 - R \quad P_4(r) = 0 \quad \uparrow \\ \lambda^4 > b_1 s_1 \lambda^4 + b_2 s_1 s_2 \lambda^4 + b_3 s_1 s_2 s_3 \lambda^4 \geq b_1 s_1 \lambda^2 + b_2 s_1 s_2 \lambda + b_3 s_1 s_2 s_3 \leftarrow \text{ez az oldalt erősebben}$$

adódik. Másféleképpen fogalmazva azt kaptuk, hogy $p_4(\lambda) > 0$ minden $\lambda \geq 1$ esetén. Ilymódon a p_4 polinom domináns $r > 0$ gyöke a $(0, 1)$ intervallumba kell, hogy essék. Ha pedig $r < 1$, akkor minden $\lambda \in (r, \infty)$ esetén $p_4(\lambda) > 0$, speciálisan a $\lambda = 1$ választással is $p_4(1) > 0$. De $p_4(1) = 1 - R$ és kész.

Vegyük észre, hogy a bizonyítás mind a négy része explicit vagy implicit módon épített a Perron–Frobenius tételre.


BOLYONGÁSI PL

PÉLDA 6. – MARKOV EGÉR A CELLÁK LABIRINTUSÁBAN avagy véletlen bolyongás háromszatú, a kettes és a hármas cella között kétkapus labirintusban. Jelölje $\xi_n = i$ azt az eseményt, hogy az egér az n -edik időpontban éppen az i -edik cellában van, ahol $n = 0, 1, 2, \dots$ és $i = 1, 2, 3$. Így a P átmenetmátrix — melynek elemei a $p_{ij} = P(\xi_{n+1} = j \mid \xi_n = i)$ valószínűségek¹²:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \pi_k^T = \pi_0^T P^k \rightarrow \pi_0^T (\mathbf{v} \mathbf{w}^T) = \frac{1}{8}(2, 3, 3) \text{ ha } k \rightarrow \infty,$$

mert $r = 1$, $\mathbf{v} = \text{col}(1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$ és $\mathbf{w}^T = \frac{1}{8}(2, 3, 3)$ (bármely $\pi_0^T \in \Sigma = \{(x, y, z) \in \text{row}(\mathbb{R}^3) \mid x + y + z = 1, x, y, z \geq 0\}$ kezdeti eloszlásra). Felismerjük $\mathbf{w}^T$ koordinátaiban az átmenetgráf csúcsainak fokszámát?

¹²Sor-sztochasztikus konvenció, ahol az átmenetgráfban $(\{i\} \rightarrow \{j\}) \in E(\mathcal{G}) \Leftrightarrow p_{ij} > 0$: az egér az egymás utáni időpontokban mindig egyforma valószínűséggel választ az aktuális cella kapui között — a cellalabirintusokból származó illetlen bolyongások $\mathcal{G}$ gráfjai és P Markov mátrixai mind speciális szerkezetűek: tekinthetjük többszörös élekkel rendelkező irányítás (és külön súlyozás) nélküli gráfoknak is őket, a hozzájuk tartozó $P = P_{\mathcal{G}} = D_{\mathcal{G}}^{-1} A_{\mathcal{G}}$ mátrixoknak pedig minden sajátértéke valós. Itt $D_{\mathcal{G}} = \text{diag}(2, 3, 3)$ az a diagonális mátrix, amelynek elemei az irányítás nélküli $\mathcal{G}$ gráf csúcspontjainak fokszámai, $A_{\mathcal{G}}$ pedig a $\mathcal{G}$ gráf szomszédsági mátrixa (ahol is $a_{12} = a_{21} = a_{13} = a_{31} = 1$ és $a_{23} = a_{32} = 2$ [a többi elem pedig nulla]).



$$r = 1 \\ v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$w^T = \frac{1}{8} (2, 3, 3)$$

Markov lánc

$$p_{ij} = P(x_{n+1} = j \mid x_n = i) \rightarrow \text{átmenet mátrix}$$

$$\pi_t^T = \pi_0^T \cdot P^k \longrightarrow P = \underline{v} \underline{w}^T \quad \pi_t^T = \pi_0^T (\underline{v} \underline{w}^T) \quad \text{ha } t \rightarrow \infty$$

egyensúlyi állapot

2. tétel — Diffúziós egyenlet és általánosításai

- **Matroszkópikus**
 - ↳ Brown-mozgás
 - ↳ bolgongolás 1D-ben
 - ↳ skalárak
- **Matroszkópikus**
 - ↳ hővezetés
 - ↳ hőenergia mérleg $\rightarrow$ diffúzió, anyagmérleg
- diffúzió-advectió-reakció egyenletrendszer
- kezdeti és perem feltételek
- kapcsolat a Gauss görbék egy családjával
- maximum-elv
- numerikus megfontolások

Matroszkópikus levezetés

A diffúzió-egyenlet kétféle levezetése és néhány tulajdonsága:

A **MAKROFIZIKAI LEVEZETÉS**: EGYENSÚLYI ELVEKBŐL — A HŐVEZETÉSI INTERPRETÁCIÓBAN Jelölje $u(t, x)$ az $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^d$ ($d = 1, 2, 3$) pont **hőmérsékletét** a $t \geq 0$ időpontban. A másik alapvető fogalom a **hőáramlás** időtől és helytől is függő **vektormezője**, az $\underline{F}(t, x)$. A harmadik a **belső hőforrások** $f(t, x)$ **sűrűségfüggvénye**.

Egy $G \subset \Omega$ térrészen belüli $Q(t) = \int_G c\rho u(t, x) dx$ **hőenergia** $\dot{Q}(t)$ megváltozása

= a ∂G peremen átáramló $-\int_{\partial G} \underline{F} \cdot \underline{ds}$ **hőenergia** + a **belső hőforrások** $\int_G f(t, x) dx$ munkája,

azaz

$$\int_G c\rho u_t(t, x) dx = -\int_{\partial G} \underline{F} \cdot \underline{ds} + \int_G f(t, x) dx$$

- $u(t, x)$ — hőmérséklet $t \geq 0$
 $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^d$ $d = 1, 2, 3$ — nyílt tartomány, korlátos, önműködő
- $\underline{F}(t, x)$ — hőáramlás vektora $\rightarrow$ vektormező ami helytől és időtől függ
- $f(t, x)$ — belső hőforrások sűrűség függvénye

Hőenergia egy $G \subset \Omega$ térrészen belül

$$Q(t) = \int_G c \cdot \rho \cdot u(t, x) dx$$

megváltozása:

$$\dot{Q}(t) = -\int_{\partial G} \underline{F}(t, x) \cdot \underline{ds} \quad \underline{F} \text{ peremen vett integrál} \rightarrow \text{felületre merőleges komponens áramlást át}$$

Hőforrásos esetén.

$$\dot{Q}(t) = \int_G c \cdot \rho \cdot u'_t(t, x) dx = - \int_{\partial G} \bar{F} d\mathbb{S} + \int_G f(t, x) dx$$

$\uparrow$ F peremén átáramló hőenergia $\uparrow$ G -ben hőforrások belső munkája

c - anyagsűrűség

g - fajhő

azaz

$$\int_G c \rho u_t(t, x) dx = - \int_{\partial G} \bar{F} d\mathbb{S} + \int_G f(t, x) dx$$

tetszőleges korlátos $G \subset \Omega$ (nyílt) tartományon, ahol ρ az anyagsűrűség és c a fajhő. Az $\int_G \operatorname{div}(v) dx = \int_{\partial G} v d\mathbb{S}$ divergenciátétel valamint a diffúzió¹ $\underline{F} = -k \operatorname{grad} u$ törvényének segítségével

$$\int_G c \rho u_t(t, x) dx = \int_G \operatorname{div}(k \operatorname{grad} u) dx + \int_G f(t, x) dx,$$

amiből a

$$c \rho u_t(t, x) = \operatorname{div}(k \operatorname{grad} u) + f(t, x) \quad (1)$$

végeredmény már közvetlenül adódik.² Amennyiben a k diffúziós együttható állandó (és nem $k = k(x)$ alakú függvény), a k állandó kihozható a divergencia operátora elé, és a végeredmény a $c \rho u_t = k \Delta u + f(t, x)$ alakra egyszerűsödik. Ha nincsenek belső hőforrások — azaz ha $f(t, x) \equiv 0$ —, akkor az $a^2 = \frac{k}{c \rho} > 0$ jelöléssel az (1) egyenlet az $u_t = a^2 \Delta u$ alakot ölti, amely egy előre megadott $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ($d = 1, 2, 3$) korlátos tartomány pontjaiban érvényes. A továbbiakban azt is feltesszük, hogy mind a c fajhő, mind a ρ anyagsűrűség, és akkor velük együtt az $a > 0$ paraméter is térben-időben állandók.

divergencia tétel: $\int_{\partial G} \bar{F} d\mathbb{S} = \int_G \operatorname{div} \bar{F} dx$

diffúzió törvénye: $\underline{F} = -\epsilon \cdot \operatorname{grad} u$

- Fourier - hőtan
- Fick - kémia
- Ohm - elektromosság

$$\begin{aligned} \dot{Q}(t) &= - \int_{\partial G} \bar{F} d\mathbb{S} + \int_G f(t, x) dx \\ &\quad - \int_G \operatorname{div} \bar{F} dx \\ \dot{Q}(t) &= + \int_G \operatorname{div}(k \cdot \operatorname{grad} u) dx - \int_G f(t, x) dx \end{aligned}$$

$$c \cdot \rho \cdot u'_t = \operatorname{div}(\epsilon \cdot \operatorname{grad} u) - f(t, x)$$

ha Δ hőforrás $\Rightarrow a = \frac{k}{c \cdot \rho} > 0$ esetén az egyenlet $\rightarrow u'_t = a \cdot \Delta u$ alakú

Δ - Laplace operátor $\rightarrow \Delta u = u''_{xx}$

Peremfeltételek:

DIRICHLET $\longrightarrow \Delta_D$

$$u_t' = \Delta_D u$$

kihűlés

peremfeltételbe be van építve az operátorba

$$\dot{x} = \Delta x$$

$$x(0) = x_0$$

sajátértékek: $-k^2$

sajátvektorok: $\sin kx$

$$\left. \sin kx \right|_{x=0}^{x=\pi} = 0$$

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x_0 = C_1 e^{\lambda_1 t} \Delta_1 + \dots + C_n e^{\lambda_n t} \Delta_n$$

$$u_t = \Delta_D u$$

$$u(0) = g$$

$$u(t) = e^{\Delta_D t} \cdot g$$

alapmegoldásai a hom. lin. differenciálnak:

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cdot u_k(t, x) \quad C_k \in \mathbb{R} \text{ kezdeti feltételből}$$

$$u(t, x) = \sum C_k e^{-k^2 t} \cdot \sin kx \Big|_{t=0} \longrightarrow u(0, x) = g(x) = \sum C_k \cdot \sin kx \quad g(x) \in L_2$$

MIÉRT?

hőmérséklet megoldás: Fourier sor $\longrightarrow$ ha Ω téglalap akkor lehetséges a Fourier sorfejtés

$$C_k = g_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} g(x) \cdot \sin kx \, dx$$

peremfelt.

$$\left. u(t, x) \right|_{\substack{x \in \partial \Omega \\ x=0 \\ x=\pi}} = 0$$

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k \sin kx \quad \Big/ \sin 5x$$

$$\int_0^{\pi} g(x) \cdot \sin 5x \, dx = C_k \int_0^{\pi} \sin^2 5x \, dx = C_k \cdot \frac{\pi}{2}$$

Megjegyzés: Az $u_t = u_{xx}$, $u(t, 0) = u(t, \pi) = 0$, $u(0, x) = g(x)$ homogén Dirichlet feladat megoldható Fourier sor alakjában:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 t} \sin(nx) \quad \text{ahol} \quad c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} g(x) \sin(nx) \, dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

Maga az egyenlet homogén lineáris, és a peremfeltétel is homogén. Így az $u(t, x)$ ($t \geq 0$, $x \in [0, \pi]$) megoldás az $e^{-n^2 t} \sin(nx)$ alapmegoldások lineáris kombinációja. A lineáris kombináció együtthatóit a $t = 0$ kezdeti állapotot leíró $g \in L_2[0, \pi]$ függvény Fourier sorfejtése szolgáltatja. Hasonlóképpen, az $u_t = u_{xx}$, $u_x(t, 0) = u_x(t, \pi) = 0$, $u(0, x) = g(x)$ homogén Neumann feladat megoldása

$$u(t, x) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 t} \cos(nx) \quad \text{ahol} \quad c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} g(x) \cos(nx) \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (3)$$

Fontos megjegyeznünk, hogy — még akkor is, ha a g függvény folytonos, sőt ha még a $g(0) = g(\pi) = 0$ kompatibilitási feltételek is teljesülnek — a megoldás "döccenve" indul: a $t = 0$ időpontban a Fourier sorok konvergenciája általában csak az $L_2[0, \pi]$ térben garantált. Szerencsére ha $t > 0$, akkor a sorösszeg végtelenszer deriválható a t és az x hibrid változóiban. A $t \rightarrow \infty$ határátmenetben a homogén Dirichlet feladat megoldásának képlete egyenletes $u(t, x) \rightarrow 0$ kihűlést, a homogén Neumann feladat megoldásának képlete

pedig az integrál-átlaghoz tartó $u(t, x) \rightarrow \frac{c_0}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} g(x) \, dx$ teljes hőmérséklet-kiegyenlítődést mutat.

(Ha az $x \in [0, L]$ intervallumon maradtunk volna egy általános $a > 0$ paraméter mellett, akkor a homogén Dirichlet feladat megoldása ez lett volna:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n \exp\left(-\left(\frac{a\pi}{L}\right)^2 n^2 t\right) \sin\left(\frac{\pi}{L} nx\right) \quad \text{ahol} \quad g_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{\pi}{L} nx\right) \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

állandók éppen a $g : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény $\{\sin(\frac{\pi}{L} nx)\}_{n=1}^{\infty}$, $x \in [0, L]$ trigonometrikus rendszer szerinti Fourier sorfejtésének együtthatói.)

NEUMANN $\longrightarrow \Delta_N$

$$u_t = \Delta u \cdot u$$

$$u_{xx} = \Delta u \quad u_x(t, 0) = u_x(t, L) = 0$$

homogenizálódás

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{\partial \Omega} = 0 \quad \text{izolációs feltétel (szigetelt)}$$

$$\left. \begin{aligned} u_t &= \Delta u \\ \left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{\partial \Omega} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad Q(t) = \int_{\Omega} u(t, x) dx$$

$\rightarrow$ irányított derivált $\rightarrow (\text{grad } u)^T \cdot \nu = 0$

$$\Delta = \text{div}$$

$$\dot{Q}(t) = \int_{\Omega} u_t dx = \int_{\Omega} \Delta u dx = \int_{\partial \Omega} \text{div grad } u dx = \int_{\partial \Omega} 0 dx = 0$$

$Q(t) = \text{konstans}$

$\downarrow$
hőmegmaradás

Megjegyzés: Homogén Neumann peremfeltétel esetén a divergencia-tételt felhasználva

$$\dot{Q}(t) = \int_{\Omega} \text{div}(k \text{ grad } u) dx = \int_{\partial \Omega} k \text{ grad } u \cdot \underline{ds} = \int_{\partial \Omega} 0 ds = 0 \Rightarrow Q(t) \equiv Q(0)$$

adódik (hiszen $(\text{grad } u(t, x), \nu(x)) = 0$ minden $t \geq 0$ esetén), ami a hőtani interpretációban hőenergia-megmaradást, a kémiai interpretációban pedig a folyadékban oldott (és a diffúzióval terjedő) anyag mennyiségének/tömegének megmaradását jelenti.

$$u_t = \Delta u$$

$$\dot{Q}(t) = \int_{\Omega} c \cdot g u_t dx = - \int_{\partial \Omega} F ds = \int_{\partial \Omega} k \cdot \text{grad } u \cdot \underline{ds} = \int_{\partial \Omega} \text{div}(\varepsilon \cdot \text{grad } u) dx$$

$$\text{grad } u \perp \nu \quad \forall x \in \partial \Omega$$

Skálázás

Megjegyzés: egy dimenzióban lineáris változó-transzformációkkal — "skálázással" — elérhető, hogy

$a = 1$ és $x \in [0, \pi]$ legyen. Valóban, ha eredetileg $x \in [0, L]$, akkor

$$a \quad \tau = \alpha t, \quad y = \beta x, \quad u(t, x) = U(\alpha t, \beta x) = U(\tau, y) \quad \text{lineáris helyettesítésekkel}$$

ez utóbbi formulát (a jobb oldalon mint összetett függvényt) t szerint egyszer, valamint x szerint kétszer deriválva $u_t = U_{\tau} \cdot \alpha$, $u_{xx} = U_{yy} \cdot \beta^2$ adódik, így az α és β paraméterek optimális megválasztásával

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad (t, x) \in [0, \infty) \times [0, L] \Rightarrow U_{\tau} \cdot \alpha = a^2 U_{yy} \cdot \beta^2, \quad \text{azaz } U_{\tau} = U_{yy} \quad \text{ha } \beta L = \pi \text{ és } \alpha = a^2 \beta^2.$$

Magától értetődik, hogy a lineáris helyettesítések a perem- és a kezdeti feltételekre is vonatkoznak.

alapvető matematikai egyszerűsítés

$$u_t = a^2 u_{xx} \quad u(t, x) \quad x \in [0, L] \quad t \geq 0$$


$$u(t, x) = U(\tau, y) = U(\alpha t, \beta x) \quad \text{lineáris transzformáció}$$

$$\left. \begin{aligned} u_t &= U_{\tau} \cdot \alpha \\ u_{xx} &= U_{yy} \cdot \beta^2 \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \alpha U_{\tau} &= a^2 U_{yy} \cdot \beta^2 \\ U_{\tau} &= U_{yy} \end{aligned}$$

$$\alpha = a^2 \beta^2 \quad \beta = \frac{L}{\pi} \quad \alpha = a^2 \frac{L^2}{\pi^2}$$

$$\tau = \alpha t \quad y = \beta x$$

$$[0, L] \Rightarrow [0, \pi] \quad a^2 \Rightarrow 1$$



Maximum elv

MAXIMUM-ELV az $u_t = \Delta u$ EGYENLETRE: Most az eddigiekben tárgyalt diffúzió-egyenlet — amelyben tehát az ismeretlen függvény $u : [0, \infty) \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ alakú, egydimenziós $t \geq 0$ idő- valamint tetszőleges, d -dimenziós $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^d$ térváltozóval — egy nagyon általános, roppant szemléletes és matematikailag könnyen bizonyítható kvalitatív tulajdonságáról lesz szó. Ez a maximum-elv, amelynek érvényesülését szinte naponta tapasztalhatjuk: Hidegzugok, melegzugok, csakúgy mint a koncentráció összesűrűsödése vagy ritkulásai egydimenziós lineáris diffúzió révén nem jöhetnek létre. A maximum-elv alapvetően egyetlen valós függvényre teljesül és már a lineárisan csatolt $u_t = \alpha^2 u_{xx} + au + bv$, $v_t = \beta^2 v_{xx} + cu + dv$ egyenletrendszerre sem érvényes — itt u és v egy-egy oldott anyagfajta téridőbeli koncentrációját jelenti, két olyan anyagét egyazon oldatban, amelynek α^2 és β^2 diffúziós egyetthatója egymással nem egyenlő. Ökol szabályként annyit mondhatunk, hogy a diffúzió-egyenlet stabilizál és homogenizál, de a diffúzió-egyenletrendszer már nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal.

Következzék a szigorú matematika:

Legyen $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ korlátos (nyílt) tartomány, és legyen $T > 0$ tetszőleges. Vezessük be az

$$\Omega_T = (0, T) \times \Omega, \quad \partial^* \Omega_T = (\{0\} \times \overline{\Omega}) \cup ((0, T] \times \partial \Omega)$$

jelöléseket³. Ekkor

$$\max\{u(t, x) \mid (t, x) \in \overline{\Omega_T}\} = \max\{u(t, x) \mid (t, x) \in \partial^* \Omega_T\}. \quad (4)$$

Bizonyítás: A bizonyítás — jöllehet annak két részre bontása ugyancsak szellemes — nem használ fel mást, mint az egyváltozós függvények vizsgálatának szokásos lépéseit.


1.) Tegyük fel először, hogy $u_t < u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2}$. Megmutatjuk, hogy (4) még ekkor is teljesül. Az indirekt feltevés azt mondja, van olyan $(t^*, x^*) \in (0, T] \times \Omega$ pont, hogy

$$u(t^*, x^*) = \max\{u(t, x) \mid (t, x) \in \overline{\Omega_T}\} > \max\{u(t, x) \mid (t, x) \in \partial^* \Omega_T\}.$$

Ekkor $u_{x_1}(t^*, x^*) = 0$ és $u_{x_1 x_1}(t^*, x^*) \leq 0$ valamint $u_{x_2}(t^*, x^*) = 0$ és $u_{x_2 x_2}(t^*, x^*) \leq 0$. Így

$$u_t(t^*, x^*) < \Delta u(t^*, x^*) = u_{x_1 x_1}(t^*, x^*) + u_{x_2 x_2}(t^*, x^*) \leq 0,$$

³A $d = 2$ választás miatt könnyű a szemléltetés. Itt Ω_T egy, az $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ téridőben fekvő korlátos nyílt henger, $\partial^* \Omega_T$ az Ω_T henger "csillagos pereme" (azaz kezdőlapjának és palástja lezárásának az uniója — a "tényleges töltényhüvely"). Annak rendje-módja szerint feltesszük, hogy az u függvény folytonos a $[0, \infty) \times \Omega$ zárt halmazon, a t időváltozó szerint egyszer, az $x = (x_1, x_2)$ helyváltozó szerint kétszer folytonosan deriválható annak $(0, \infty) \times \Omega$ belsejében, továbbá ugyanott eleget tesz az $u_t = \Delta u$ ($\equiv u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2}$) egyenletnek.



Max elv $\rightarrow$ minimumet zuge $\rightarrow$ 1D diffúzió révén NEM

$$\max_{(t,x) \in \partial^* G} u(t,x) = \max_{(t,x) \in \overline{G}} u(t,x)$$

egyetlen valódi perem igaz $\rightarrow$ lin csatolt egyenletrendszerre nem

$G \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$ korlátos, nyílt

$$G_T = (0, T) \times \Omega$$

$T > 0$

$$\partial^* G_T = (\{0\} \times \overline{G}) \cup ((0, T] \times \partial \Omega)$$

- kezdőlap és palást lezárásának uniója

Bizonyítás:

Bizonyítás: A bizonyítás — jöllehet annak két részre bontása ugyancsak szellemes — nem használ fel mást, mint az egyváltozós függvények vizsgálatának szokásos lépéseit.

1.) Tegyük fel először, hogy $u_t < u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2}$. Megmutatjuk, hogy (4) még ekkor is teljesül. Az indirekt feltevés azt mondja, van olyan $(t^*, x^*) \in (0, T] \times \Omega$ pont, hogy

$$u(t^*, x^*) = \max\{u(t, x) \mid (t, x) \in \overline{\Omega_T}\} > \max\{u(t, x) \mid (t, x) \in \partial^* \Omega_T\}.$$

Ekkor $u_{x_1}(t^*, x^*) = 0$ és $u_{x_1 x_1}(t^*, x^*) \leq 0$ valamint $u_{x_2}(t^*, x^*) = 0$ és $u_{x_2 x_2}(t^*, x^*) \leq 0$. Így

$$u_t(t^*, x^*) < \Delta u(t^*, x^*) = u_{x_1 x_1}(t^*, x^*) + u_{x_2 x_2}(t^*, x^*) \leq 0,$$

Tfú $u_t' < u_{x_1 x_1}'' + u_{x_2 x_2}'' \rightarrow u_t' < \Delta u$

indirekt: $\exists (t^*, x^*) \in (0, T] \times \Omega$ melyre

$$u(t^*, x^*) = \max_{\overline{\Omega_T}}(u(t, x)) > \max_{\partial^* \Omega_T}(u(t, x))$$

akkor: $u_{x_1}'|_{(t^*, x^*)} = 0$ $u_{x_1 x_1}''|_{(t^*, x^*)} \leq 0$ & $u_{x_2}'(t^*, x^*) = 0$ $u_{x_2 x_2}''(t^*, x^*) \leq 0$

$$u_t' < \Delta u \leq 0 \quad t=t^* \quad x=x^*$$

$$\rightarrow u(t^* - \delta, x^*) \quad 0 < \delta < 1$$

$$(t^* - \delta, x^*) \in (0, T] \times \Omega$$

$\rightarrow$ olyan pontok halmozára melyekre u értéke nagyobb mint $u_{\max} \rightarrow$

amiből $u(t^* - \delta, x^*) > u(t^*, x^*)$ ha $0 < \delta \ll 1$ (azaz ha $\delta > 0$ elegendően kicsi). Tehát olyan pont(ka)t sikerült megkonstruálni a $(0, T] \times \Omega$ halmazban, ahol az u függvény értéke nagyobb a maximumnál, ami ellentmondás.

2.) Most visszatérünk az eredeti u függvényhez. Az $\varepsilon > 0$ paraméter segítségével definiáljuk a $v_\varepsilon(t, x) = u(t, x) - \varepsilon t$ segédfüggvényeket. Mivel

$$(v_\varepsilon)_t(t, x) = u_t(t, x) - \varepsilon = \Delta u(t, x) - \varepsilon < \Delta u(t, x) = \Delta v_\varepsilon(t, x),$$

a bizonyítás első része szerint

$$\max\{v_\varepsilon(t, x) \mid (t, x) \in \overline{\Omega_T}\} = \max\{v_\varepsilon(t, x) \mid (t, x) \in \partial^* \Omega_T\}$$

tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén. A kívánt (4) tulajdonság az $\varepsilon \rightarrow 0^+$ határátmenettel adódik. $\square$

A maximum-elmet a $-u$ függvényre átfogalmazva a

$$\min\{u(t, x) \mid (t, x) \in \overline{\Omega_T}\} = \min\{u(t, x) \mid (t, x) \in \partial^* \Omega_T\} \quad (5)$$

minimum-elmet kapjuk. A maximum-elv és a minimum-elv együttes következménye — ha azokat a két hipotetikus megoldás különbségére alkalmazzuk — az $u_t = \Delta u + f(t, x)$, $u(0, \cdot)|_\Omega = g$, $u|_{(0, \infty) \times \partial\Omega} = h$ KEZDETI- ÉS PEREMÉRTÉK-FELADAT KLASSZIKUS (az előző lábjegyzetben felsorolt símasági feltételeket kielégítő) MEGOLDÁSÁNAK UNICITÁSA. Ez utóbbi kijelentés független a kérdéses megoldás létezésétől.

Vegyük észre, hogy a bizonyítás lokális jellegű és tetszőleges $(t_1, t_2) \times G \subset (0, \infty) \times \Omega$ nyílt henger "töltényhüvely"-t alkotó "csillagos perem"-ére megismételhető, akkor is ha az x térváltozó nem $d = 2$, hanem $d = 1, 3$ vagy éppen $d \geq 4$ dimenziós. A bizonyítás első része azt is mutatja, hogy maga a maximum-elv igaz az $u_t = \Delta u - u^2$ nemlineáris reakció-diffúzió egyenletre is, ahol a $-u^2$ "forrástag" soha nem lehet pozitív.

$$v_\varepsilon(t, x) = u - \varepsilon t \quad v_\varepsilon' = u_t' - \varepsilon = u_{xx}'' - \varepsilon < \Delta u = \Delta v_\varepsilon$$

$$\max_{\bar{\Omega}_T} (v_\varepsilon) = \max_{\partial^* \Omega_T} (v_\varepsilon)$$

tehát leges $\varepsilon > 0$ esetén $\varepsilon \rightarrow 0^+$ határmenettel

$$\max_{\bar{\Omega}} (u) = \max_{\partial^* \Omega} (u)$$

$-u \rightarrow$ minimum elv

$$\min_{\bar{\Omega}_T} \{u\} = \min_{\partial^* \Omega_T} \{u\}$$

Mikroszkópikus

A MIKROFIZIKAI PONTOSABBAN A STATISZTIKUS FIZIKAI LEVEZETÉS: A DIFFÚZIÓ BROWN-MOZGÁS SZERINTI INTERPRETÁCIÓJÁBAN Egyetlen pontszerű részecske bolyong a számegeyenesen. Mozgásáról csak annyit tudunk, hogy adott helyzetből δt idő alatt $\frac{1}{2}$ valószínűséggel jobbra, $\frac{1}{2}$ valószínűséggel balra megy, éspedig δx távolságot.


Jelölje $P(t, x)$ annak a valószínűségét, hogy a részecske a t időpillanatban a számegeyenes x pontjától balra helyezkedik el. A t és a $t + \delta t$ időpillanat közötti lehetséges elmozdulásokat figyelembe véve, a $P(t + \delta t, x)$ valószínűségét kifejezzük a t időpillanathoz tartozó különböző valószínűségekkel. Az az állapot, hogy a $t + \delta t$ időpontban a részecske az x ponttól balra helyezkedik el, kétféleképpen alakulhat ki: ha a t időpillanatban balra volt az $x - \delta x$ ponttól, vagy ha benne volt az $(x - \delta x, x + \delta x)$ intervallumban. Az előző esetben továbbra is balra marad az x ponttól, az utóbbi esetben pedig a jobbra vagy balra lépések egyikével az x ponttól jobbra, másikával az x ponttól balra kerül. A valószínűségét figyelembe véve azt kapjuk, hogy a kétváltozós P függvény eleget tesz a

$$P(t + \delta t, x) = P(t, x - \delta x) + \frac{1}{2}(P(t, x + \delta x) - P(t, x - \delta x))$$

algebrai összefüggésnek. Ezután mindkét oldalból kivonjuk a $P(t, x)$ valószínűséget és osztunk a δt , a jobb oldalon pedig bővítünk a $(\delta x)^2$ kifejezéssel. Így

$$\frac{P(t + \delta t, x) - P(t, x)}{\delta t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{P(t, x - \delta x) - 2P(t, x) + P(t, x + \delta x)}{(\delta x)^2} \cdot \frac{(\delta x)^2}{\delta t},$$

1D bolyongás $\rightarrow$ námegeyenes



$P(t, x)$ — valószínűség, x ponttól balra helyezkedik el t időben

$$P(t + \delta t, x) =$$



$x - \delta x$ ponttól balra $\rightarrow$ balra marad x H'el

$(x - \delta x, x + \delta x) \rightarrow$ jobb/bal

$$= P(t, x - \delta x) + \frac{1}{2}(P(t, x + \delta x) - P(t, x - \delta x)) \quad \Bigg/ \quad -P(t, x)$$

$\frac{1}{2} P(t, x - \delta x) + \frac{1}{2} P(t, x + \delta x)$

$$P(t+\delta t, x) - P(t, x) = \frac{1}{2} \cdot (P(t, x-\delta x) - 2P(t, x) + P(t, x+\delta x))$$

$$\frac{P(t+\delta t, x) - P(t, x)}{\delta t} = \frac{1}{2} \frac{P(t, x-\delta x) - 2P(t, x) + P(t, x+\delta x)}{\delta^2 x} \cdot \frac{\delta x^2}{\delta t}$$

$$P_t' = \frac{1}{2} P_{xx}'' \cdot \frac{\delta x^2}{\delta t} \quad \frac{dx^2}{dt} \cdot \frac{1}{2} = 1 \text{ és } \frac{\delta t}{dx} \rightarrow 0$$

$$P_t' = P_{xx}''$$

majd a $\frac{(\delta x)^2}{2\delta t} = 1$ skálázással és a $\delta t, \delta x \rightarrow 0$ határátmenettel a remélt $P_t(t, x) = P_{xx}(t, x)$ parciális differenciálegyenlet adódik.

Ha a $t = 0$ kezdeti időpontban a részecske biztosan az $x = 0$ pontban volt (azaz $P(0, x) = H(x)$ ahol H a Heaviside függvény), akkor a hőmaggal (lásd a 10-ik oldalon) vett konvolúciós integrál a

$$P(t, x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} H(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} d\xi = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} d\xi = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{4t}} dz = \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{2t}}\right)$$

végeredménnyé egyszerűsödik. Itt $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{s^2}{2}} ds$, a **standard normális eloszlás** eloszlásfüggvénye.

A fizikusok ezt úgy mondják, hogy a diffúzió a Dirac deltát (vagy más nézőpontból a Heaviside függvény általánosított deriváltját és ha úgy tetszik, **Brown vízbe dobott pollen-csomagocskáját**) $t > 0$ idő alatt az

$\mathcal{N}(0, \sigma) = \mathcal{N}(0, \sqrt{2t})$ **normális eloszlás** $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ **sűrűségfüggvényévé** keni szét.

4

$t=0$ -ban $P(0, x)$ $x=0$ pontban van $\Rightarrow$ hőmaggal vett konvolúciós integrál

A diffúzió-egyenlet a számegyenesen — **Poisson megoldóképlete és a normális eloszlás**

Tétel: Tetszőleges $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és korlátos függvény esetén

$$u(t, x) = \begin{cases} g(x) & \text{ha } t = 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4t}\right) d\xi & \text{ha } t > 0 \end{cases} \quad (11)$$

megoldása, és pedig **egyetlen** megoldása az $u_t = u_{xx}$, $(t, x) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}$ egyenletnek, az $u(0, x) = g(x)$ kezdeti feltétel mellett. A konvolúciós integrál magfüggvénye az úgynevezett "hőmág".

Diffúzió - advekción - reakció egyenletek

ÖSSZEFOGLALÁS: Az $u_t = -\operatorname{div}(F) + f$ egyenlet változatai alapvetően F és f választásától valamint - rendszerek esetében - a csatolásoktól függenek:

- diffúzió: $F = F_{\text{diff}} = -k_1 \operatorname{grad} u$ diffúzió egyenlet általános alakja
- advekción: $F = F_{\text{adv}} = k_2 u v$, ahol v az áramló közeg ismert sebessége
- advekción-diffúzió: $F = F_{\text{adv-diff}} = -k_1 \operatorname{grad} u + k_2 u v$
- reakción-diffúzió: $u_t = \alpha^2 \Delta u + f(u, v)$, $v_t = \beta^2 \Delta v + g(u, v)$ — ahol $\dot{u} = f(u, v)$, $\dot{v} = g(u, v)$ egy, az Ω tartomány minden pontjában azonos módon lejátszódó kémiai reakción egyenletrendszere
- chemotaxis-diffúzió: $F = F_{\text{chemotaxis-diff}} = -\ell u \operatorname{grad} c - \beta^2 \operatorname{grad} u$, ahol a szaporodni is képes bakterium (koncentrációja u) menekül egy külső kémiai folyamatban képződő mérge (koncentrációja c) elől — így a csatolt rendszer: $c_t = \alpha^2 \Delta c + f(c)$, $u_t = \beta^2 \Delta u - \ell \operatorname{div}(u \operatorname{grad} c) + g(c, u) = -\operatorname{div} F$

verhetünk mindezt

Mindezek a parciális differenciálegyenletek perem- és kezdeti feltételekkel együtt értendők.

Az első három példa mindegyike — már amennyiben az f forrástag sem függ az u ismeretlentől — az advekción-diffúzió egyenlettel bezárólag lineáris feladat. A k_1 diffúziós együttható a legegyszerűbb esetben valódi, az $x \in \mathbb{R}^d$ ($d = 1, 2, 3$) térváltozótól független állandó: a $\operatorname{div}(k_1 \operatorname{grad} u) = k_1 \Delta u$ azonosság ekkor érvényes. A diffúziós k_1 és az advekción k_2 együtthatók helytől és időtől való függetlensége az alkalmazások

diffúzió $\rightarrow u'_t = -\operatorname{div} F \rightarrow$ mérési hőforrás

$$F = -\operatorname{grad} u \cdot k$$

$$u'_t = \operatorname{div} k_1 \operatorname{grad} u$$

advekción $\rightarrow F = k_2 \cdot u \cdot v \rightarrow v$ - áramló közeg sebessége

advekción-diffúzió $\rightarrow F = F_{\text{adv-diff}} = -k_1 \operatorname{grad} u + k_2 u \cdot v$

lineáris egyenletek

reakción diffúzió $\rightarrow$ nem lin. csatolás

$$u'_t = \alpha^2 \Delta u + f(u, v)$$

$$v'_t = \beta^2 \Delta v + g(u, v)$$

tartomány $\forall$ pontjában azonosan lejátszódó kémiai reakción $\rightarrow$ verhetünk mindezt

chemotaxis diffúzió $\rightarrow F = -\operatorname{grad} u \cdot \beta^2 - \ell \cdot u \operatorname{grad} c$

spontán mozgás áramlással mozgás $\rightarrow$ mérge elől menekül

csatolt rendszer

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{mérge reakción szerint képződik} \rightarrow c'_t &= \alpha^2 \Delta c + f(c) \\ u'_t &= \beta^2 \Delta u - \ell \cdot \operatorname{div}(u \operatorname{grad} c) + g(c, u) \end{aligned}$$

Gauss gördet

Numerikus megfontolások

3. tétel — Analitikus módszerek közönséges differenciálegyenletek vizsgálatára

- Linearizálás
- lokális fázisportré egyensúlyi helyzetek körül
- elemi következtetések $\rightarrow$ vektormező, Liapunov függvények alapján
- fázisportré változók paramétereit változtatásával
 $\hookrightarrow \mu \ll 0$ bifurkációs ábrák
 $\hookrightarrow \dot{x} = \mu - x^2, \dot{y} = -y$
 $\hookrightarrow \dot{r} = \mu r - r^3, \dot{\varphi} = -1$ Hopf
- stabilitás és vörös, egyensúlyi helyzet, periodikus pályák
- Numerikus megfontolások
- 2D-eszt specifikációi, Ω halmaza síkon
- Lotka-Volterra két-faj modelljei

Linearizálás

2.7. Linearizálás egyensúlyi helyzetek körül

Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy a kérdéses egyensúlyi helyzet, ami körül linearizálni szeretnénk, $x_0 = 0$. Legyen $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ C^1 függvény. Így

$$f(x) = Ax + a(x), \quad \text{ahol } A = f'(0) \text{ és } a(x) = f(x) - Ax.$$

Magától értetődik, hogy $a: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ is C^1 függvény, melyre $a(0) = 0$ és $a'(0) = f'(0) - A = 0$. Itt $a(0) = 0$ természetesen $\mathbb{R}^d$ -beli vektor, $a'(0) = 0$ pedig a $d \times d$ méretű, csupa nulla eleméből mátrix. Jóllehet a 0 különböző terek — jelesen $\mathbb{R}^d, L(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ (és akkor a 0 $\in \mathbb{R}$ kezdeti időpontot még nem is említettük) — nulla-elemét jelenti, a kontextus megakadályozza, hogy azokat bármikor is összekeverjük egymással.

Tekintsük tehát az

$$(N) \quad \dot{x} = Ax + a(x)$$

nemlineáris egyenletet, és annak origó körüli linearizáltját, az

$$(L) \quad \dot{x} = Ax$$

lineáris egyenletet. Az (L) lineáris egyenletről lényegében mindent tudunk, ha sajátértékeit és sajátvektorait ismerjük. Tetszőleges $x(0) = x_0$ kezdeti feltételhez tartozó megoldása $x_{0,x_0}(t) = e^{At}x_0$, sőt ezt a megoldást a $t \rightarrow e^{At}$ mátrix-függvénnyel együtt ki is tudjuk számolni. Az (N) nemlineáris egyenlet megoldásait nem lehet zárt alakban meghatározni. De nem is kell, hiszen azokat az (L) lineáris egyenlet megoldásai kvalitatív és kvantitatív jól közelítik. Természetesen csak lokálisan, az origó egy kicsiny környezetében, és csak akkor, ha az A mátrix $\lambda_k = \lambda_k(A)$ sajátértékeire teljesül a

$$\operatorname{Re} \lambda_k(A) \neq 0, \quad k = 1, 2, \dots, d \quad (2.16)$$

feltétel. Ekkor a lokális fázisportrék is azonosnak tekinthetők, sőt ez az azonosítás a numerikus fázisportrékra is kiterjeszthető.



1 equilibrium pont körül!


lokális

akkor lehet
ha $\operatorname{Re} \lambda_i \neq 0 \quad i=1,2,3$

λ_k a lineáris egyenlet sajátértéke

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f(x) & x &\in \mathbb{R}^2 & f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 & C^1 f \\ \hookrightarrow \text{nem lineáris egyenlet} & \rightarrow \text{linearizált} & \dot{x} &= \underline{A}x \\ \operatorname{trace} \underline{A} &= a+d = T \\ \det \underline{A} &= a \cdot d - b \cdot c = D \end{aligned}$$





$\exists$ leképezés köztük $\rightarrow$ Homeomorfizmus (nem változat az értéke)

Linearizálás:

0. szimmetria
1. $\operatorname{Re} \lambda_k \neq 0 \quad k = 1, 2, 3, \dots, d$
2. fázisor felületek

$$\left. \begin{aligned} f(Tx) &= T \cdot f(x) \\ \phi(t, Tx) &= T \cdot \phi(t, x) \\ \psi(h, Tx) - T \psi(h, x) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &T: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d \\ &T \text{ általában} \\ &\text{ortogonális} \end{aligned}$$

ert nem nagyon mi
de a fizetemen volt

$$|\phi(h, x) - \psi(h, x)| \text{ Taylor sor - } k \text{ ba fejte}$$

$$\leq K h^{p+1}$$

$\psi(h, x)$ lokális hibája

A TANTÁRGY NEVÉT ADÓ TÁGABB DEFINÍCIÓ: Legyen (X, d) metrikus tér és legyen T az $\mathbb{R}, \mathbb{R}^+, \mathbb{Z}, \mathbb{N}, h\mathbb{Z}, h\mathbb{N}$ halmazok bármelyike. A $\Phi: T \times X \rightarrow X$ leképezés **T idejű dinamikus rendszer** X -en, ha igazak az alábbi axiómák:

- (i) Φ folytonos,
- (ii) $\Phi(0, x) = x \quad \forall x \in X$,
- (iii) $\Phi(t, \Phi(s, x)) = \Phi(t+s, x) \quad \forall t, s \in T \quad \forall x \in X$.

A hatféle időválasztást párokba csoportosítva

- $T = \mathbb{R}$ (illetve $T = \mathbb{R}^+$) esetén Φ folytonos idejű (semi)dinamikus rendszer,
- $T = \mathbb{Z}$ (illetve $T = \mathbb{N}$) esetén Φ diszkrét idejű (semi)dinamikus rendszer,
- $T = h\mathbb{Z}$ (illetve $T = h\mathbb{N}$) esetén Φ $h > 0$ lépésközű (semi)dinamikus rendszer.

DINAMIKUS RENDSZER LINEARITÁSÁNAK DEFINÍCIÓJA: Legyen $(X, \|\cdot\|)$ Banach (azaz teljes normált) tér és legyen T az $\mathbb{R}, \mathbb{R}^+, \mathbb{Z}, \mathbb{N}, h\mathbb{Z}, h\mathbb{N}$ halmazok bármelyike. A $\Phi: T \times X \rightarrow X$ dinamikus rendszer lineáris, ha az (i)–(ii)–(iii) axiómák mellett az is igaz rá, hogy

- minden rögzített $t \in T$ esetén $\Phi(t, c_1 x_1 + c_2 x_2) = c_1 \Phi(t, x_1) + c_2 \Phi(t, x_2) \quad \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R} \quad \forall x_1, x_2 \in X$.

A (18) nemlineáris $T = \mathbb{R}, X = \mathbb{R}^d$ alappélda lineáris változata az $d \times d$ méretű, valós számokból felépített A mátrix által meghatározott $\dot{x} = Ax$ közönséges, autonóm lineáris differenciálegyenlet

$$\Phi_L: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad (t, x) \rightarrow \Phi_L(t, x) = e^{At}x$$

alakú megoldó-operátora.

Ha a (18) képletben szereplő nemlineáris differenciálegyenletben $f \in C^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ és $f(0) = 0$, akkor az f függvényt a $0 \in \mathbb{R}^d$ egyensúlyi helyzet körül linearizálva $f(x) = Ax + a(x)$ adódik, ahol $A = f'(0)$ a 0-ban vett Jacobi mátrix és az $a \in C^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ függvényre $a(0) = 0$ és $a'(0) = 0$ (az azonosan nulla $d \times d$ mátrix).


Jelölje $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_d$ az A mátrix sajátértékeit. A $0 \in \mathbb{R}^d$ mint az $\dot{x} = Ax$ differenciálegyenlet egyensúlyi helyzete nem-elfajult, ha minden $k = 1, 2, \dots, d$ esetén $\operatorname{Re} \lambda_k \neq 0$. A nem-elfajultságnak ez a definíciója az $\dot{x} = f(x)$ differenciálegyenlet bármely más egyensúlyi helyzetére is automatikusan kiterjeszthető.

Fázisportré

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -x+y \\ \dot{y} &= -x-y \end{aligned} \implies \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} + c_2 e^t \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{ha } x(0) &= 1 \\ y(0) &= 0 \end{aligned} \implies c_1 = 1, c_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$$




kiforgatott az $x-y$ síkban

A fázisportré bármely pontjában ismerjük az ottani megoldásgörbe érintővektorát.

↳ T-D diagram elfajult és nem elfajult esetek

$$\begin{aligned} \lambda_1, \lambda_2 &\in \mathbb{R} \\ c_1 e^{\lambda_1 t} \underline{s}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \underline{s}_2 \end{aligned}$$



$$|\phi(h, x) - \psi(h, x)| \quad \text{Taylor sorok fejte} \leq K \cdot h^{p+1} \quad \text{lokalis hiba}$$

$$p=1 \Leftrightarrow \text{érintő közelítés}$$

$$p = \text{deriválás rendje} \rightarrow \text{ahol a derivált megegyezik}$$

$$f(x_0) + T(x_0)(x - x_0) \quad \text{Linearizálás} \rightarrow \text{lokalis}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix} \rightarrow \text{helyes mozgás} \quad \left\langle \text{energia-megfélélet; trajektória érintő} \right\rangle$$

normál vektora

$$\text{adott } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \text{ pontban} \rightarrow \begin{aligned} &L: \text{centrum} \\ &N: \text{globális maximum} \\ &M: \text{globális minimum} \end{aligned}$$

$$\text{általában: } E \quad \dot{x} = f(x) \quad \& \quad V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\dot{V}_{(x)} = \frac{d}{dt} V(x(t)) \Big|_{t=0} = \left\langle \text{grad } V(x(t)), \dot{x}(t) \right\rangle \Big|_{t=0} = \left\langle \text{grad } V(x), f(x) \right\rangle < 0$$

$$V - \text{mértékelt}$$

$$\dot{V} = \text{grad } V \rightarrow \text{mértékelt normál vektor}$$

Ljapunov fr.

Szintfelület és normálvektora

A $V: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ függvény $x_0 \in \mathbb{R}^d$ ponton áthaladó szintfelülete — egyelőre jobb volna a színhalmaz kifejezést használni — az $\{x \in \mathbb{R}^d \mid V(x) = V(x_0)\}$ halmaz. Ha a V függvény C^1 és $V'(x_0) \neq 0$, akkor ez a szintfelület az x_0 pont egy kis környezetében ténylegesen is felület, amelynek normálvektora az x_0 -beli

$$\text{grad}V(x_0) = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}(x_0), \frac{\partial V}{\partial x_2}(x_0), \dots, \frac{\partial V}{\partial x_d}(x_0) \right)$$

gradiens-vektor, amelyet magával az $1 \times d$ méretű $V'(x_0)$ deriváltmátrix-szal azonosíthatunk.

Tekintsük most az $\dot{x} = f(x)$ autonóm differenciálegyenletet az x_0 pont egy kis környezetében. Minden további megfontolásunk központjában

a $\langle \text{grad}V(x_0), f(x_0) \rangle$ skaláris szorzat előjele áll.

Ha ez a skaláris szorzat pozitív, azaz a $\text{grad}V(x_0)$ és az $f(x_0)$ által közrezárt szög hegyesszög, akkor az $\dot{x} = f(x)$ egyenlet x_0 ponton átmenő trajektóriája az x_0 -hoz közeli szintvonalakat azok növekvő sorrendjében metszi, ha negatív, akkor a csökkenő sorrendben. Ez az egyszerű észrevétel messzire, nagyon messzire elvezet, ha azt egy szintfelület, vagyis inkább egy szintfelület-család, egy Matryósa-baba szerűen egymásba skatulyázott szintfelület-család összes pontjára egyszerre alkalmazzuk. A skaláris szorzat nem-nulla előjele azt a geometriai kényszert fejezi ki, hogy a trajektóriák vagy befelé, a Matryósa-baba közepe felé haladjanak, vagy kifelé, a fordított irányba, az egyes szintfelületeket belülről kifelé metszve.

2.55. Definíció Legyen $\mathcal{N} \subset \mathbb{R}^d$ nyílt halmaz és tekintsük az

$$(E) \quad \dot{x} = f(x), \quad x \in \mathcal{N}$$

autonóm differenciálegyenletet és a $V: \mathcal{N} \rightarrow \mathbb{R}$ C^1 függvényt. A V függvény (E) egyenlet szerinti deriváltja az $x \in \mathcal{N}$ pontban:

$$\dot{V}_{(E)}(x) = \frac{d}{dt} V(\Phi(t, x)) \Big|_{t=0},$$

ahol $\Phi(t, x)$ az $\dot{x} = f(x)$ differenciálegyenlet lokális megoldó-operátora az $\mathcal{N}$ halmazon.

Az $\dot{x} = f(x)$ differenciálegyenlet megoldásai általában nem az egész számegyenesen vannak értelmezve, hanem csak addig, ameddig el nem érik az $\mathcal{N}$ halmaz $\partial\mathcal{N}$ határát, tehát esetenként csak nagyon rövid időintervallumokon. Ezen időintervallumok mindegyike nyílt intervallum és a kezdeti $t_0 = 0$ időpillanatot tartalmazza. Tehát a $t = 0$ pontban vett idő szerinti parciális derivált minden gond nélkül értelmezett. Ráadásul $\dot{V}_{(E)}(x)$ kiszámítása az (E) egyenlet megoldása nélkül is lehetséges. Sőt, kifejezetten könnyű. Mindössze az összetett függvény deriválási szabályát kell alkalmazni, a

$$\frac{d}{dt} V(\Phi(t, x)) = [V'(\Phi(t, x))] \left(\frac{d}{dt} \Phi(t, x) \right) = [V'(\Phi(t, x))] f(\Phi(t, x))$$

szereposztással. A $t = 0$ helyettesítéssel ebből

$$\dot{V}_{(E)}(x) = [V'(x)] f(x), \quad \text{azaz} \quad \dot{V}_{(E)}(x) = \langle \text{grad}V(x), f(x) \rangle \text{ adódik.} \quad (2.22)$$

A V függvény szigorú minimumhelyeinek környezetében a $\dot{V}_{(E)}(x) \leq 0$ és a $\dot{V}_{(E)}(x) < 0$ egyenlőtlenségek stabilitáshoz illetve aszimptotikus stabilitáshoz vezetnek.

Ljapunov $\longrightarrow$ nem-lokális módszer

2.57. Definíció Az $N \subset \mathbb{R}^d$ halmaz erős Ljapunov felület az $\dot{x} = f(x)$ autonóm differenciálegyenletre nézve, ha van olyan $V: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ C^1 függvény és olyan $c \in \mathbb{R}$ állandó, hogy

$$N \subset \{x \in \mathbb{R}^d \mid V(x) = c\} \quad \text{és} \quad \langle \text{grad} V(x), f(x) \rangle < 0 \quad \forall x \in N.$$

Az alternatív szóhasználat szerint a V erős Ljapunov függvény az $N \subset \mathbb{R}^d$ halmazon, ha $\langle \text{grad} V(x), f(x) \rangle < 0$ minden $x \in N$ esetén.

N halmaz $\longrightarrow$ Ljap. felület $\dot{x} = f(x)$ -re

ha $\exists V: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ és

$\hookrightarrow$ autonóm differenciálegyenlet

$\exists c$ melyre

$$N \subset \{x \mid V(x) = c\} \quad \text{és} \quad \langle \text{grad} V(x), f(x) \rangle < 0 \quad \forall x \in N$$

lokálisan stabil, aszimptotikusan stabil

2.56. Tétel A.) Legyen az $x_0 \in \mathbb{R}^d$ pont egyensúlyi helyzete az (E) egyenletnek, azaz legyen $f(x_0) = 0$. Legyen továbbá az $N \subset \mathbb{R}^d$ halmaz az x_0 pont nyílt környezeté, és legyen $V: N \rightarrow \mathbb{R}$ olyan C^1 függvény, amelyre

$$V(x_0) < V(x) \quad \forall x \in N \setminus \{x_0\} \quad \text{és} \quad \dot{V}_{(E)}(x) \leq 0 \quad \forall x \in N. \quad (2.23)$$

Ekkor az x_0 egyensúlyi helyzet (lokálisan) stabil.

x_0 -hoz közel esőket is tartalmazó szomszédos nyílt környezet

B.) Tegyük fel, hogy a (2.23) feltétel helyett teljesül az alábbi tulajdonság:

$$V(x_0) < V(x) \quad \forall x \in N \setminus \{x_0\} \quad \text{és} \quad \dot{V}_{(E)}(x) < 0 \quad \forall x \in N \setminus \{x_0\} \quad (2.24)$$

Ekkor az x_0 egyensúlyi helyzet (lokálisan) aszimptotikusan stabil.

Legyen továbbá $c > V(x_0)$ olyan állandó, amelyre

$$N_{c \leq} = \{x \in N \mid V(x) \leq c\} \quad \text{korlátos és mint } \mathbb{R}^d \text{ részhalmaza, zárt.} \quad (2.25)$$

Ekkor az $N_{c \leq}$ halmaz része az x_0 egyensúlyi helyzet attraktivitási tartományának,

lokálisan stabil x_0 egyensúlyi helyzet:
 $\hookrightarrow \dot{x} = f(x)$
 $f(x_0) = 0$

N x_0 környezete
 $V: N \rightarrow \mathbb{R}$

$$V(x_0) < V(x) \quad \forall x \in N \quad \text{és} \quad \dot{V}_{(E)}(x) \leq 0 \quad \forall x \in N$$

ha $\dot{V} < 0 \Rightarrow$ aszimptotikusan stabil

$$\exists c > V(x_0): N_c \equiv \{x \in N \mid V(x) \leq c\} \quad \text{korlátos zárt}$$

akkor $N_c \leq$ része x_0 egyensúlyi helyzet attraktivitási tartományának

Periodikus pályák stabilitása


polaris koordináták



periodikus pályát nem tudják előre kiszámni $\rightarrow$ nem tudjuk stabil-e



megnézzük magányos egyenlet leír
tanító kör



nem nézzük meg magányos egyenlet leír
vonal kör

ha N globálisau vonzó $\Rightarrow \emptyset$ periodikus pályák (fajpáros)

ha $\exists$ periodikus pályák akkor belül lenne egyenlet helyzet

ta'voli pont tanító jellege

$\dot{V} < 0$


trajektória' zárt görbe' helyet mutat a mikroszkóp

számítások a síkon

stabil csomó/fókusz $\Leftrightarrow$ vonzó csomó/fókusz


instabil csomó/fókusz $\Leftrightarrow$ taszító csomó/fókusz

általános egyenlet helyzet: stabilitás $\neq$ vonzás



$$\begin{cases} \dot{r} = 0 \\ \dot{\varphi} = -1 \\ \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{r} = r(1-r) \\ \dot{\varphi} = \sin^2 \frac{\varphi}{2} \end{cases}$$



$$x(t) = r(t) \cdot \cos \varphi(t) \text{ \& } y(t) = r(t) \cdot \sin \varphi(t)$$

$$Tf \quad \begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \Leftrightarrow x_0, x_0(\cdot) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

existencia, unicitás
folytonos függés

definíciók

$$\Phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(t, x) \rightarrow x_{0,x}(t) = \Phi(t, x)$$

$$x_0 \in \mathbb{R}^n \text{ egyenlet helyzet} \Leftrightarrow f(x_0) = 0 \Leftrightarrow \Phi(t, x_0) = x_0 \quad \forall t$$

$$\text{stabil} \Leftrightarrow \forall \varepsilon \exists \delta, \text{ hogy } |x_0 - x| < \delta \Rightarrow |x_0 - \Phi(t, x)| < \varepsilon \quad \forall t \geq 0$$

$$\text{vonzó} \Leftrightarrow \exists \eta_0, \text{ hogy } |x_0 - x| < \eta_0 \Rightarrow \Phi(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x_0$$

$$\text{asimptotikusan stabil} \Leftrightarrow \text{stabil \& vonzó}$$

$$\text{vonzási tartomány} \Leftrightarrow \mathcal{A}(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \Phi(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x_0\}$$

$$\text{instabil} \Leftrightarrow \text{nem stabil}$$

Paraméterek


Bifurkáció

$$\dot{x} = \mu - x^2$$

$$\dot{y} = -y$$

$$J = \begin{pmatrix} -2x & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

egyensúlyi pont $\dot{x} = 0$
ha $x = \pm\sqrt{\mu}$



$$\dot{r} = \mu r - r^3 \quad \text{Hopf bifurkáció}$$





$$\dot{\varphi} = -1$$

$$r(\mu - r^2)$$

$$r = 0$$

$$r = \pm\sqrt{\mu}$$

$$\varphi = -1$$



felül felugras
alul csúszás
↳ transzmisszió bifurkáció


$$\text{Hopf} \quad \dot{r} = r(\mu - r^2)$$

$$\dot{\varphi} = -1$$

$$\dot{r} = \pm r \mu \pm r^3$$

$$\varphi = -1$$


↳ tanítás/összeadás
 $\mu \rightarrow$ irány



nyugodó-csúszó bif.

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \mu - x^2 \\ \dot{y} &= -y \end{aligned}$$

$\int$ ezt az előjeleket nézve




$\mu < 0$


$\hookrightarrow$ egyensúlyi helyzetek bifurkációja esetén a lineárisan nem segít

$\hookrightarrow$ nézzük a magasabb fűlé tagot is

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} \lambda_1, \lambda_2 &= 0 \leftarrow \text{legális} \\ \lambda_3 &= 0 \end{aligned}$$



$\mu = 0$



$\mu > 0$

Lotka Volterra

Ez eddig elmondottak mind-mind kiterjeszthetők arra az esetre, amikor több, egymás élet-lehetőségeire a legkülönbözőbb módokon ható fajokból álló ökoszisztémákat vizsgálunk. Ez a *többfaj-modellek* világa. Két faj együttélésének (közös erőforrásokért) *versengő*, *szimbiotikus*, avagy éppen *ragadozó-zsákmány* eseteinek szokásos

$$\begin{cases} \dot{x} = x(c_1 + a_1x + b_1y) \\ \dot{y} = y(c_2 + a_2x + b_2y) \end{cases} \quad \text{ahol } c_1, c_2, a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R} \text{ adott konstansok és } x, y \geq 0 \quad (16)$$

kvadratikus differenciálegyenlet-modellje Lotka és Volterra nevéhez fűződik. Az esetszétváztásokat a $c_1, c_2, a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ paraméterek előjelei határozzák meg. A hat paraméter közül három (de nem bármelyik három) lineáris változó-helyettesítéssel ± 1 -re kiskálázható. A Kolmogorov féle általánosítás

$$\dot{x}_k = x_k f_k(x_1, x_2, \dots, x_d) \quad \text{ahol } x_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, d \quad (17)$$

alakú. Itt $f_k : \mathbb{R}_+^d \rightarrow \mathbb{R}$ ($k = 1, 2, \dots, d$) adott folytonosan differenciálható függvények. A biológiailag releváns fázistér — amint az a (16) és a (17) egyenletrendszerekben is megjelenik — $\mathbb{R}^2$ illetve $\mathbb{R}^d$ nemnegatív (és az indukált dinamikára invariáns) ortánsa. Magától értetődik, hogy az ortánsok végtelen távoli pontja egyetlen trajektóriát sem vonzhat: minden trajektóriának $t \rightarrow \infty$ mellett a biológia okán egyenletesen korláatosnak kell maradnia. Ez azt is jelenti, hogy szimbiotikus ökoszisztémákat kvadratikus Lotka-Volterra rendszerekkel csak az $\mathbb{R}^d$ korlátos részhalmazain lehet modellezni.

A kétdimenziós Lotka-Volterra (16) rendszerek konkrét példák és általánosításokon át történő — nem minden részletében egyformán olvasható, de reményeim szerint mégiscsak jól követhető — bemutatása a Nemlineáris Dinamika jegyzet²² 3.8 fejezetében található. A dinamika jellege az egyensúlyi helyzetek kis környezetében a linearizálás módszerével, a “nyom-determináns” ábra szerinti esetszétváztásokkal állapítható meg. Az $x \geq 0, y \geq 0$ síknegyeden kívüli pontokkal nem kell törődnünk, mivel azok semmilyen biológiai jelentést sem hordoznak. Az origó mindig egyensúlyi helyzet, a vízszintes $y = 0, x \geq 0$ és a függőleges $x = 0, y \geq 0$ féltengelyek pedig egyenként is mindig invariánsak: a dinamika rajtuk könnyen megrajzolható.

$$\dot{x} = x(c_1 + a_1x + b_1y)$$

$$\dot{y} = y(c_2 + a_2x + b_2y)$$

$$x, y \geq 0$$

inhibitor

verseng

ragadozi - tsaluduy

$$\dot{x} = x(1 - x + y)$$


$$\dot{y} = y(1 - 3y - x)$$

$$\dot{x} = x(2 - x - y)$$

$$\dot{y} = y(1 - y - x)$$

$$\dot{x} = x(2 - x + y)$$

$$\dot{y} = y(1 - y - x)$$



4. tétel — Példák hálózatoson értelmezett dinamika

- évenkénti adóbevallást $x_{i,t+1} = F(\bar{x}_{i,t})$ általános modellje
elégtéves feltétel globálisan aszimptotikusan stabil konvergencia fixpont létezésére, matematikai realitás
- véletlen gráfok Erdős-Rényi, Strogatz-Watts, Barabási-Albert típusú + függvényegyenlet
járványterjedés
- további modellek nagyrehatósságra $\rightarrow$ gyakorlat, más tárgyak

Adóbevallások

AZ ADÓCSALÁS EGY ÁGENS-ALAPÚ MODELLJE Adott egy irányítás nélküli G gráf, amelyben sem hurokélek, sem többszörös élek, sem izolált csúcsok nincsenek. A G gráf $V(G) = \{1, 2, \dots, N\}$ csúcsai egy ország adófizetőit jelentik. Az i -edik csúcshoz fokszáma $d_i > 0$, az i -edik csúccsal szomszédos csúcsok halmaza N_i ($i = 1, 2, \dots, N$), amely tehát az i -edik adófizető ismerőseit — látni fogjuk, bizalmas ismerőseit — jelenti. Ebben az országban **egykulcsos adó** van, és az adó befizetése évente egyszer, **önkéntes adóbevallás** alapján történik. A matematikai egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy minden adófizető éves jövedelme egyformán egységnyi. Jelölje $0 < \theta < 1$ az **adókulcs** mértékét. A t -edik évben ($t = 0, 1, \dots$) az i -edik adófizető által bevallott jövedelem legyen $x_{i,t}$.

Az adófizetők azonban nem tisztelik a törvényt. *Feltéve, de meg nem engedve* a modell szerint nem vallják be teljes jövedelmüket: a feltételezés szerint mindenki **úgy csal** a rákövetkező évben, hogy a saját ismerősei által bevallott jövedelmek átlagát veszi alapul és az $x_{i,t+1}$ értékét egy kétváltozós **elégedettségi függvény** feltételes maximumhelyeként számolja ki. Az elégedettségi függvényt egyrészt a **nála maradó** $1 - \theta x_{i,t+1}$ összeg nagysága, másrészt a **várható büntetéstől való félelem** határozza meg: ez utóbbi egyenesen arányos mind a **bizalmas ismerősök által az előző évben bevallott $\bar{x}_{i,t}$ átlagos jövedelem**-mel, mind egy, az adott országra jellemző $m > 0$ **moralitási tényező**-vel. Az elégedettségi függvény definíciója — a

G — irányítás nélküli gráf

i — index $\rightarrow$ csúcsok : adófizetők

(i, j) -élek $\rightarrow$ bizalmas ismeretség

$0 < \theta < 1$ adókulcs (normált modell $\rightarrow$ egységes fizetés)

$$x_{i,t+1} = F\left(\frac{1}{\#N_i} \sum_{j \in N_i} x_{j,t}\right) \leftarrow \text{ismerősök által bevallott jövedelmek átlaga} \quad \forall \text{ neműj jövedelme} = 1$$

elégedettségi f.: nála maradó összeg + várható büntetéstől való félelem

$\hookrightarrow$ arányos $\rightarrow$ ország moralitási tényezőjével
 $m > 0$

$\hookrightarrow$ előző évben bevallott átlagos jövedelemmel $\bar{x}_{i,t}$

elégendőségi fr.

közgazdászok szeretik a logaritmus függvényt⁵³:

$$\mathcal{U} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1] \quad , \quad (x, \bar{x}) \rightarrow \mathcal{U}(x, \bar{x}) = \ln(1 - \theta x) + m\bar{x}(x - \ln(x)) \quad .$$

Az i -edik adófizető a $(t+1)$ -edik évben bevallott jövedelmét a most már egyedül logikus

$$\bar{x}_{i,t} = \frac{1}{d_i} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} x_{j,t} \quad , \quad i = 1, 2, \dots, N \quad , \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

képlet és a szintén plauzibilis

$$x_{i,t+1} = F(\bar{x}_{i,t}) \quad , \quad \text{ahol} \quad F(\bar{x}) = \arg \max \mathcal{U}(\cdot, \bar{x}) \quad (30)$$

formula szerint számolja ki. Természetesen bizonyításra szorul, hogy a (30) formula valóban jóldefiniált. Ehhez pedig a magától értetődő $0 \leq x_{i,0} \leq 1$ ($i = 1, 2, \dots, N$) feltétel és az $\mathcal{U}(\cdot, \bar{x})$ függvény konkavitása a $[0, 1]$ intervallumon éppen elegendő⁵⁴.

A kapott diszkrét idejű dinamikus rendszer állapottere a $[0, 1]^N$ egységkocka, a dinamikát definiáló leképezés pedig

$$\mathcal{F} : [0, 1]^N \rightarrow [0, 1]^N \quad , \quad (\mathcal{F}(\mathbf{x}))_i = F\left(\frac{1}{d_i} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} x_j\right) \quad , \quad i = 1, 2, \dots, N \quad .$$

A dinamika annyiban van csak a $\mathcal{G}$ gráfon definiálva, hogy az i index (amely az egységkocka adott pontjához annak i -edik koordinátáját rendeli) a $\mathcal{G}$ gráf i -edik csúcsára utal.

Az $m > \theta$ feltétel mellett implicit deriválásokkal könnyű igazolni, hogy az $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ függvény kielégíti az $F'(0) = \frac{m}{\theta} > 1$, $F' > 0$, $F'' < 0$ egyenlőtlenségeket. Mivel $F(0) = 0$, az F függvénynek egyetlen $x^* > 0$ fixpontja van a $[0, 1]$ intervallum belsejében, és az is világos, hogy az $x^{\ell+1} = F(x^\ell)$, $\ell = 0, 1, 2, \dots$ iterációt bármely $0 \neq x^0 \in [0, 1]$ pontból indítva az $\ell \rightarrow \infty$ határátmenetben $x^\ell \rightarrow x^*$.

harmadosági fr = elégendőségi fr :

$$\mathcal{U}(x, \bar{x}) = \ln(1 - \theta x) + m \cdot \bar{x} (\ln x - x)$$

$$F(x) = \arg \max \mathcal{U}(\cdot, \bar{x})$$

elégendőségi felt. glob. aszimpt. stabil hogyan fixpont létezik

Véletlen gráfok

szociális hálózatok, biológiai hálózatok

gen regulátor circuit → DNS és fehérje kölcsönhatás

Erdős–Rényi gráfok: Adva van n csúcspont és egy $0 < p < 1$ szám. Az n csúcspont között lehetséges $\binom{n}{2}$ él mindegyikét p valószínűséggel behúzzuk. Az így kapott $\mathcal{G}(n, p)$ gráf csúcsainak fokszám-eloszlása a

$$P(\deg(v) = k) = \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

binomiális eloszlás, amely nagy n -re jól közelíthető a $\mathcal{N}(\mu, \sigma) = \mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)})$ normális eloszlással. Az $np = \lambda > 0$, $n \rightarrow \infty$ határátmenetben a

$$P(\deg(v) = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Poisson eloszlás a határérték.

Az Erdős–Rényi gráfokra jellemzőek a *határértékképzés kritikus konstansai*⁶⁰. Ezek a kritikus konstansok a gráf bizonyos vagy–vagy tulajdonságaival függenek össze, amelyek az egyes esetekben aszimptotikusan

egy valószínűséggel teljesülnek. Hogy csak a legegyszerűbb példákat vegyük,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{np}{\ln(n)} < 1 &\Rightarrow \mathcal{G}(n, p) \text{ nem összefüggő} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{np}{\ln(n)} > 1 &\Rightarrow \mathcal{G}(n, p) \text{ összefüggő} \end{aligned}$$

és

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} np < 1 &\Rightarrow \mathcal{G}(n, p) \text{ maximális komponensének nagyságrendje } \text{const} \cdot \ln(n) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} np > 1 &\Rightarrow \mathcal{G}(n, p) \text{-ben pontosan egy óriás-komponens van, } \text{const} \cdot n \text{ nagyságrenddel.} \end{aligned}$$

Strogatz–Watts gráfok⁶¹: a Watts–Strogatz konstrukció az n csúcsú d -reguláris körgráfból indul ki, amelynek $\frac{nd}{2}$ számú éle van. (Itt $2 \leq d < 2n$ szükségképpen páros szám: a d -reguláris körgráfot a hagyományos körgráfból kiindulva úgy kapjuk meg, hogy minden egyes csúcsot a tőle jobbra és balra $\leq \frac{d}{2}$ hosszúságú úttal elérhető többi csúccsal is közvetlen élel kötjük össze. A gyakorlatban szokásos paraméter-választás $1 \ll \ln(n) \ll d \ll 2n$.) Körbemenve a $V_1, V_2, \dots, V_n$ csúcsokon, a V_i csúctól "hátrafelé" "induló" (V_j, V_i) élek mindegyikét $0 \leq \beta \leq 1$ valószínűséggel kicseréljük egy akkor–éppen–nem–élre, amelynek egyik végpontja a V_i csúcs marad (az akkor–éppen–nem–élek közül az egyenletes eloszlás szerint válogatva). Így az eredeti d -reguláris körgráf minden egyes élére pontosan egyszer kerül sor, és a konstrukció mindvégig kizárja többszörös vagy hurokélek létrejöttét. A $\beta = 0$ esetben az eredeti d -reguláris körgráf változatlan marad, a $\beta = 1$ esetben pedig egy $\mathcal{G}(n, p)$ Erdős–Rényi gráfot kapunk, ahol — hiszen az élek száma nem változott — $p = \frac{nd}{2} / \binom{n}{2}$. A β interpolációs paraméter szokásos választása egyébként $0 < \beta \ll 1$.

Barabási–Albert gráfok: a Barabási–Albert konstrukció kiindulópontja bármely n_0 csúcspontú $\mathcal{G}_{n_0}$ (szokás szerint összefüggő) gráf lehet, amelyhez lépésenként mindig egy új csúcspontot veszünk hozzá. Az új csúcspontot és a már korábban meglévő csúcspontokat rendre $0 < m \leq n_0$ számú éllel kötjük össze, a párhuzamos és a hurokéleket most is kizárva. Az új élek behúzása azonban nem egymástól független véletlenek szerint történik, hanem preferenciákat, a régi csúcspontok tudatos súlyozását követi. Az $n_0 + i + 1$ -ik ($i = 0, 1, \dots$) új csúcspontnak a j -edik ($j = 1, 2, \dots, n_0 + i$) csúcsponttal való összekötése annál valószínűbb, minél nagyobb a j -edik csúcspontra aktuális fokszáma. A Barabási–Albert preferenciaszabály szerint

$$(n_0 + i + 1, j) \in E(\mathcal{G}_{n_0+i+1}) \text{ valószínűsége egyenesen arányos } \frac{\deg(j)}{\sum_{1 \leq k \leq n_0+i+1} \deg(k)} \text{-val.}$$



Matematikailag bizonyított eredmény, hogy az $i \rightarrow \infty$ határátmenetben az egyre növekvő gráf aszimptotikus fokszámeloszlása a

$$P(\deg(v) = k) \approx \frac{\text{const}(m)}{k^3}, \quad k \gg n_0 \quad (32)$$

7. tétel — Idegi ingerületvezetés: Hodgkin-Huxley alapmodell

- Kisebbség a hirtelen óriási axonon
- ionáramlás az idegrost sejtmembránját át, mi kajfa
- elektrikus áramkör modell és egyenlet rendezés
- Ingerülésköb és regenerációk időtükrözés
- AP mint ingerületbe adott válasz és hirtelen kettő "V", "Na-pumpa", "K-pumpa"
↳ "h, m, n" ábrák
- Utolsó hullám az idegrostban és H-H egyenletrendszerben

$$\frac{dV}{dx} = -R \cdot I_{axon}$$



Kábel egyenlet

$$(1) \frac{\partial V}{\partial x} = -R I_{axon}$$

$$(2) \frac{\partial I_{axon}}{\partial x} = I_{membran}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = -R \frac{\partial I_{axon}}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = I_{membran} \cdot R$$

Helyettesítésként átalakítok áramot → idő


induktív jelenség elhanyagolható $V_L = L \frac{\partial I}{\partial t}$

lineáris ellenállás $V_R = I_R \cdot R$

kapacitív tag $V_C = \frac{1}{C} \int I_C(s) ds \rightarrow V_C = \frac{1}{C} I_C$

↳ más egyenleteket is csatolni kell → t változó + deriváltak

I. PDE + 3KDE → parabolikus ⇒ utolsó hullám



Utolsó hullám (stabil) sebessége ugyanaz sejtben mint valóságban $\rightarrow 20 \mu/s$

II. hKDE $\rightarrow$ erüst dönt az axon közepén $\rightarrow$ x-től nem függ semmi
 Erüst dönt jól vezet az áramot
 V-től függ

Átviteltet külön vezetők Cl^- , K^+ , Na^+

KDE paraméterek helyett függvényeket használ $\rightarrow$ SOK SZÁMOLÁS

Víz hűtése constanten nélkül $\rightarrow T(\epsilon) = T^* - T(\epsilon) \rightarrow$ exponenciális
 Newton féle csillapítási törvény


analógiája:

$$h_{\infty} = \lim_{V \rightarrow \infty} h(V)$$

$$\tau_n(V) \quad h = h_{\infty}(V) - h$$

$$h' = \tau_n(V) h + \beta_n(V) (1 - h) \rightarrow$$
 kapu nyitlása és csukódása

Áramutórt helyettesítő kör:



lineáris ellenállás

nem lineáris ellenállás
 $\rightarrow$ feszültség függő

konduktivitás: $g = \frac{1}{R}$
 $\bar{g}_K$ - constant

kapacitállandók $\rightarrow g_{ce} = \bar{g}_{ce}$

$$g_K = \bar{g}_K \cdot h \cdot u^4$$

h, u, v
 $\tau_h(V) \frac{1}{V}$ és e^{-V} -vel
 "fejleszt" odéba
 $g_{Na} = \bar{g}_{Na} \cdot u^4$

Nernst - törvény

hajtó erő: koncentráció különbség: diffúzió $K \leftarrow K$
 feszültség különbség: elektromos erő $+ \rightarrow -$

Egyensúlyi állapot $\rightarrow$ 1 ionra $-I_{Cl} - I_{Ca} = 0 \Rightarrow \frac{C_i}{C_o} = \frac{P_o}{P_i} \cdot e^{-\frac{a \cdot \delta}{V}} \ln \frac{C_{out}}{C_{in}} = \frac{P_o}{P_i} (P_{in} - P_{out})$

h megfigyeltől elég 3-at mérni

h megfigyeltől validálható a modell

$$V_{Cl} = \frac{-RT}{2F} \ln \frac{C_{Cl,i}}{C_{Cl,o}}$$

Erüst dönt körlet

$$\begin{aligned} C_m V' &= -g_{ce}(V - V_{ce}) \\ &\quad -g_{Na}(V - V_{Na}) \\ &\quad -g_K(V - V_K) \end{aligned}$$

$$\tau_n(V) u' = u_{\infty}(V) - u$$

$$\tau_h(V) h' = h_{\infty}(V) - h$$

$$\tau_v(V) v' = v_{\infty}(V) - v$$

+ $\frac{I_{stimulus}}{C_m}$
 (felvétel)

$$\Sigma I_i = g_{Na} u^3 h (u - E_{Na}) + g_K u^4 (u - E_K) + g_{cl} (u - E_{cl})$$

$E_{Na, K}$ - reversal potential




Ion vize molekulaival együtt megy át a membránon

2 félé kapcsolódási - zárási mechanizmus

Dugó

Önműködés

1 regenerációs ciklus $\rightarrow$ refrakter periódus - nélkül nem tud újabb ingert fogadni



gyors változó: V, m

lassú változó: h, n

$$h + n \approx 0.87$$

$$n(t, x) = \bar{g}_n h \cdot m^3 = g_{Na}, \quad g_K = \bar{g}_K \cdot n$$

$$N(x - ct) =$$

$$\text{Utári hullám PDE-ben} \quad v(t, x) = V(x - ct)$$

$$c = \text{sebesség}$$

$$c \cdot t = dx$$

II-II DE rendszer

$$1. \quad I = C_m \frac{dV_m}{dt} + \bar{g}_K u^4 (V_m - V_K) + \bar{g}_{Na} u^3 u (V_m - V_{Na}) + \bar{g}_e (V_m - V_e)$$

$$2. \quad \frac{du}{dt} = \alpha_u(V_m)(1-u) - \beta_u(V_m)u$$

$$3. \quad \frac{dm}{dt} = \alpha_m(V_m)(1-m) - \beta_m(V_m)m$$

$$\alpha_p(V_m) = p_{\infty}(V_m) / \tau_p$$

$$4. \quad \frac{dh}{dt} = \alpha_h(V_m)(1-h) - \beta_h(V_m)h$$

$$\beta_p(V_m) = (1 - p_{\infty}(V_m)) / \tau_p$$

$$I = C_m \cdot \frac{dV}{dt} - g_{Na}(V_m - V_{Na}) - g_K(V_m - V_K) - g_e(V_m - V_e)$$

$$1 \quad C_m \dot{V} = -g_{Na}(V_m - V_{Na}) - g_K(V_m - V_K) - g_e(V_m - V_e)$$

$$2 \quad \tau_m \dot{u} = u_{\infty}(V_m) - u$$

$$3 \quad \tau_m \dot{u} = u_{\infty}(V_m) - u$$

$$4 \quad \tau_h \dot{h} = h_{\infty}(V_m) - h$$

